СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД

для защиты плодовых культур от комплекса болезней и сахарной свеклы от мучнистой росы и церкоспороза

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА!

Скор®

syngenta®

™

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ И НОРМА РАСХОДА

Культура	Объект	Норма расхода препарата, л,кг/га	Способ обработки	Сроки ожидания, дни (кратность обработок)
Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	0,4	Опрыскивание в период вегетации.	20(2)
Яблоня	Мучнистая роса, парша	0,15–0,2	Опрыскивание в период вегетации 0,015–0,02%-ным рабочим раствором. **Программа профилактических обработок:** с интервалом 7–10 дней, начиная с фазы розового бутона до фазы диаметр плодов 10 мм, 10–14 дней в последующие фазы развития яблони. Допускаются обработки в период цветения. **Программа обработок по сигнализации** (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза): обработку проводить не позднее, чем через 96 часов после начала инфицирования. Рекомендуется блок обработок фунгицидом СКОР® или чередование с препаратами других химических классов. В случае проведения блока обработок фунгицидом СКОР® продолжить обработки фунгицидами другого химического класса в полной норме расхода через 8 дней после последней обработки фунгицидом СКОР®. **В случаях эпифитотийного развития болезни**, а также для защиты чувствительных к парше сортов, если применяется контактный фунгицид: препаратом СКОР® (0,2 л/га) + контактный фунгицид (75% обычной нормы). Интервал между опрыскиваниями 7 дней.	20(4)

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Скор® 250 к.э. обладает профилактическим, защитным и лечебным действием, однако, рекомендуется применять препарат на ранних стадиях инфицирования, чтобы избежать необратимых повреждений растения и распространения болезни. Профилактические обработки на яблоне проводятся с интервалом 7-10 дней с фазы розового бутона, 10-14 дней с фазы 10 мм яблок. Обработки против парши проводить не позднее 96 часов после начала инфицирования.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

При профилактических обработках 7–10 дней (в условиях умеренного развития болезней) и 7 дней в условиях эпифитотийного развития болезней. Куративное действие в течение 96 часов с момента начала заражения.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

2 часа после обработки.

Блок 2-4 обработок или чередование с препаратами других химических классов

через 7-10 дней

через 10-14 дней

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Хранить препарат под замком вдали от солнечных лучей и сырости в хорошо проветриваемом помещении, отдельно от пищи и кормов. Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах при температуре от -10°С до +35°С. Не устанавливать контейнеры более чем 2 метра в высоту во избежание спрессования и повреждения.

Срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке. Дата изготовления указана на упаковке.

Действующее вещество	дифеноконазол 250 г/л
Химический класс	триазолы
Класс опасности	3
Препаративная форма	концентрат суспензии
Упаковка	канистра 1 л

КОНТАКТЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе 3, 501 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

www.syngenta.kz

@syngenta_kazakhstan

syngenta®
www.syngenta.kz