ФУНГИЦИД

для защиты зерновых колосовых от комплекса болезней листьев и колоса, обеспечивающий стабильный урожай и качество товарного и семенного зерна.

ЭТАЛОН ЭФФЕКТИВНОСТИ

Тилт®

syngenta®

ТМ

СВОЙСТВА

- **Широкий спектр действия на всех зерновых культурах**
- **Системное действие**
- **Высокая продолжительность действия**
- **Единая норма расхода для всех культур**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Высокая эффективность и надежность в борьбе с экономически важными заболеваниями листьев и колоса зерновых культур (септориоз, ржавчина, ринхоспороз, пиренофороз)**
- **Не только увеличивает урожайность, но и повышает качество зерна**
- **Не смывается дождем**
- **Простота в применении**
- **Безопасность для человека**

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Объект	Норма расхода препарата, л/га	Способ обработки	Сроки ожидания, дни (кратность обработок)
Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	0,5	Опрыскивание в период вегетации.	30(1)
Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость			
Рожь озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз, церкоспореллез			
Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость			
Смородина черная (маточники)	Американская мучнистая роса, антракноз, септориоз	1,5	Опрыскивание в период вегетации 0,15% эмульсией препарата	-(1)
Смородина черная (маточники, питомники)	Американская мучнистая роса	0,4-0,5	Опрыскивание в период вегетации 0,05% эмульсией препарата	
Райграс пастбищный, кострец безостый, овсяница луговая (семенные посевы)	Гельминтоспориоз	0,5	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
Клевер луговой 2-го года вегетации	Антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость	1,0	Опрыскивание в фазе стеблевания 0,2% эмульсией препарата	

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Тилт® 250 к.э. обладает профилактическим, защитным и лечебным действием, однако, рекомендуется применять препарат на ранних стадиях инфицирования, чтобы избежать необратимых повреждений растения и распространения болезни (от 1% до максимум 3% зараженных листьев).

Зерновые культуры

Объект: Комплекс болезней стеблей, листьев и колоса.
Норма расхода: 0,5 л/га
Интервал между обработками: 3-4 недели
Время применения: Тилт® 250 к.э. рекомендуется применять на стадии 29 – 65 дней после посева. Начинайте обработку на ранних стадиях поражения растений (при поражении от 1 до 3% растений). Повторите обработку через 3-4 недели если поражение болезнью продолжается и появляются новые очаги поражения. Для борьбы с септориозом рекомендуется провести две обработки, первая на стадии 37-45 и вторая 51-65. Тилт® 250 к.э. может применяться в баковой смеси с другими продуктами (напр. хлороталонил).
Для более эффективного контроля мучнистой росы, пероноспороза и ринхоспориоза Тилт® 250 к.э. может применяться в баковой смеси с препаратами, содержащими другие активные вещества.

Травы (семенные посевы)

Объект: ржавчины, мучнистая роса и сетчатая пятнистость
Норма расхода: 0,5 – 1,0 л/га
Интервал: 14-21 день, в зависимости от степени поражения растений.

Время применения: Наилучший результат был получен при проведении программы, состоящей из 2-4 опрыскиваний препаратом Тилт® 250 к.э.. Первая обработка проводится при наступлении благоприятных условий для развития болезней. Наибольший эффект достигается при проведении обработки на ранней стадии развития болезней – не более 5% пораженных листьев.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить препарат под замком вдали от солнечных лучей и сырости в хорошо проветриваемом помещении, отдельно от пищи и кормов. Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах при температуре от -10°C до +35°C. Не устанавливать контейнеры более чем 2 метра в высоту во избежание спрессования и повреждения.
Срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке. Дата изготовления указана на упаковке.

Действующее вещество	пропиконазол 250 г/л
Химический класс	триазолы
Класс опасности	3
Препаративная форма	концентрат эмульсии
Упаковка	канистра 5 л

КОНТАКТЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе 3, 501 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

www.syngenta.kz

@syngenta_kazakhstan

syngenta
www.syngenta.kz