

Морковь - Мучнистая роса, альтернариоз и церкоспороз.

		Амистар® Топ 0,75-1,0 л/га. Кратность 2-3 раза Интервал между обработками 10-14 дней	
---	--	---	--

Томат - Фитофтороз, альтернариоз.

		Амистар® Топ 0,75-1,0 л/га. Кратность 2-3 раза Интервал между обработками 10-14 дней	
---	--	---	--

Бахча (дыня) - Мучнистая роса, аскохитоз.

		Амистар® Топ 0,75-1,0 л/га. Кратность 2-3 раза Интервал между обработками 10-14 дней	
---	--	---	---

Амистар® Топ 

КОНТАКТЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
 г. Астана, Коргалжинское шоссе 3, 501 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89
 г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, 100/4, БЦ «PRIME Business Park», 3 этаж.

 www.syngenta.kz

 @syngenta_kazakhstan

syngenta®



**ТОП ВЫБОР КАЗАХСТАНСКИХ ФЕРМЕРОВ
 ВЫРАЩИВАЮЩИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ
 ОВОЩИ**

- Контроль широкого спектра болезней
- Превосходный физиологический эффект
- Отличное отрастание корнеплодов
- Выход качественной продукции
- Прибыльные результаты

Амистар® Топ 



Инновационное решение
 компании Сингента для
 получения качественного урожая

Амистар® Топ

Системно-контактный фунгицид широкого спектра действия с профилактическими, лечебными и антиспорулянтными свойствами. Рекомендован для применения в интегрированных системах защиты овощных культур.

	азоксистробин, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л
	стробилурины, триазолы
	канистра 5 л / 4x5 л
	3 года с даты изготовления
	3
	концентрат суспензии



Преимущества

- Обладает мощным лечебным, профилактическим и антиспорулянтным действием
- Имеет стимулирующее физиологическое действие – озеленяющий эффект, что улучшает качество, товарность и повышение урожайности
- Снижает влияние негативных стрессовых факторов на растение, чем самым способствует раскрытию потенциала культуры
- Оптимальное антирезистентное решение
- Устойчив к осадкам, что делает его гибким относительно сроков применения.
- Совместим с многими средствами защиты растений, совпадающими по срокам применения
- Короткий срок ожидания – 14 дней
- Обладает всеми преимуществами «Технологии Амистар»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Амистар® Топ



Амистар® Топ действует эффективно на всех стадиях развития патогенов

Амистар® Топ содержит два активных действующих вещества, которые являются уникальными в своем химическом классе и обеспечивают лечебное и профилактическое действие для борьбы с болезнями, длительный эффект и безопасность, отличный урожай.

Кроме того, **Амистар® Топ** устойчив к осадкам, что делает его гибким относительно сроков применения.

Азоксистробин - первоклассное защитное действие


- Относится к группе стробилуринов. Подавляет прорастание спор на ранних этапах развития грибов, обеспечивая мощную защиту от инвазии патогенной грибковой флоры.
- Также проявляет активность на начальных этапах жизненного цикла грибов и обеспечивает антиспорулянтное действие.
- Обработанные растения получают физиологические преимущества (повышенное озеленение), что увеличивает товарную урожайность культуры.

Дифеноконазол - мощное лечебное действие

- Относится к группе триазолов. Поглощается растением и действует на грибковый патоген при проникновении и формировании гаусторий.
- Останавливает развитие грибов путем вмешательства в биосинтез стеролов в клеточных мембранах.

Хотя режим действия позволяет использовать препарат для защиты и лечения, его рекомендуется применять на достаточно ранних этапах, чтобы избежать необратимого повреждения растений и развития болезней

Лук - Альтернариоз, пероноспороз, стеμφилиоз.



Картофель - Фитофтороз, альтернариоз.

